



## 第二节 碳酸盐岩的生物骨骼组分

Organic skeletal constituents  
of carbonate rocks



# 一、碳酸盐岩中生物骨骼的主要矿物成分

Main mineral composition of skeleton in carbonate rocks

主要矿物成分

钙碳酸盐（钙质）

钙磷酸盐（磷质）

氧化硅（硅质）

有机化合物



钙质为绝大部分无脊椎动物和藻类植物的  
造骨物质，主要矿物成分为：

低镁方解石 ( $\text{MgCO}_3 < 4\text{mol\%}$ )

高镁方解石 ( $\text{MgCO}_3 > 4\text{mol\%}$ )

文石 ( $\text{MgCO}_3 < 1\text{mol\%}$ )



具低镁方解石质硬体的生物主要有：

低等门类的蓝藻、红藻的管孔藻科、褐藻、  
金藻、甲藻、轮藻、纤毛纲、海绵、古杯。

高等门类较低级的床板珊瑚、四射珊瑚、苔  
藓虫、腕足类、竹节石类、三叶虫、甲壳纲等。



具高镁方解石质硬体的生物主要有：

棘皮动物、珊瑚藻、粟米虫、八射珊瑚、  
红藻等。

具文石质硬体的生物主要有：

软体动物(头足、腹足、瓣鳃)、绿藻、  
水螅、六射珊瑚、裸松藻、龙介和某些有孔虫  
等。

文石、高镁方解石  $\longrightarrow$  低镁方解石



磷质矿物主要为胶磷矿和磷灰石，但后者常常混有碳酸钙成分。磷质主要为脊椎动物和牙索动物的主要造骨矿物。

组成生物硬体的有机化合物，主要有几丁质、壳蛋白、海绵丝和胶原等。

有机质硬体多发育于节肢动物、多毛纲、无铰纲和某些原生动物中。



硅质矿物有石英、玉髓和蛋白石。它们多是低等生物硬体的矿物组分。

如硅藻、金藻、硅甲藻和放射虫、太阳虫以及硅质海绵骨针、硅质鞭毛虫等生物的硬体。

镁碳酸盐矿物（简称镁质），只有白云石一种。前寒武纪的少数蓝藻分泌原白云石（多钙白云石）。三叠系的低等藻类也有的是由白云石组成的。



## 二、钙质生物骨骼的结构分类

Textural classification of calcareous skeleton

骨骼结构是指组成生物骨骼的矿物晶体的形状、大小、排列以及晶粒间的相互关系。

按晶体的空间  
分布形态分



粒状结构

纤状结构

片状结构

柱状结构



## (一) 粒状结构 (Granular texture)

由大致等粒状的方解石或文石晶粒组成，  
是低等生物的主要结构类型。

按晶粒大小和光性方位分为五种类型。

粒状结构

胶粒或粘粒结构

隐粒结构

微粒结构

晶粒结构

单晶结构



## 1. 胶粒或粘粒结构

由微晶方解石（或文石）胶结稍大的方解石、石英、长石粉砂以及其他碳酸盐颗粒而成。

此种结构仅见于最低等的生物，如蓝藻、红藻、低等有孔虫和某些多毛类蠕虫等。



## 2. 隐粒结构

由 $0.5\text{--}1\text{ }\mu\text{m}$ 的碳酸盐颗粒组成。

因其颗粒太细、光线多被折射和反射而显光性杂乱，加之常含有较多的有机质，故在单偏光镜下色暗不透明。

此种结构常见于蓝绿藻、红藻化石、部分有孔虫、层孔虫及珊瑚幼年期硬体、蜓壳的致密层等。




### 3. 微粒结构

由  $1\sim 5 \mu\text{m}$  ( 或  $10 \mu\text{m}$  ) 的碳酸盐颗粒组成。


光性杂乱、色稍浅、微透明。晶粒有时略有定向特征。

红藻的细胞壁、有孔虫内层、海绵体壁和骨针、古杯体壁等常具此种结构。





微粒结构常与隐粒结构伴生，且不易区分，故可合为一类。



照片 III-1-【1】 隐粒结构、微粒结构



图为螺旋切面中部上方，有旋壁及其向内弯曲的隔壁，构成许多房室。旋壁和隔壁都有隐粒结构的致密层和



## 4. 晶粒结构

由 $>5 \mu\text{m}$ 的方解石晶体镶嵌组成，光性杂乱，薄片中透明。

主要是经矿物晶格的转化作用或重结晶作用转变而来的。





## 5. 单晶结构

由全部或局部为一致消光的单一隐粒晶体组成，有时可为双晶或3~5个连晶组成。

据X-射线分析，消光一致的大晶体实际上是由无数个光性方位一致（或两组小晶体光性方位互相垂直）的小晶体组成。这些晶体很小，以致于在一般显微镜下分辨不清。

单晶结构是棘皮动物骨板的特征。






单晶形状

连生单晶  
网格单晶  
薄壁单晶

€ 连生单晶结构

由单晶方解石组成，呈一致消光。有时可  
见解理纹，并在其边部常见有机质尘点。






海百合茎



，网格单晶结构  
为海胆类的主要特征。



它与海百合不同  
的是其网格孔隙被外  
来的单晶方解石充  
填。原生方解石与后  
来充填于网孔的方解  
石C轴相互垂直，但本  
身分别一致消光。



### ③薄壁单晶结构

方解石单晶的C轴平行于壁的丝的长轴（或生长方向），因而显平行消光。

仅见于窗格苔藓虫的间壁、中棱和翁格达藻丝体的细胞壁中。



## (二) 纤状结构 (Fibrous texture)

由平行或放射状排列的单向延长的方解石 (或文石) 晶体组成。

光性轴C轴与纤(柱)状延长轴一致, 纤体多小于10  $\mu\text{m}$ 。

按生长基底的形态、生长方式和大小划分:



层(正)纤结构

柱纤结构

球纤结构

柱层纤结构


玻纤结构




## 1. 层(正)纤结构

纤体(文石、方解石) **垂直基底面生长**  
(少数斜交)。

其中单层者，称为  
**正纤**；纤体分阶段间歇  
生长形成多层的层状构  
造，称之为**层纤**。





照片 III-1-【9】 层纤结构

珊瑚隔壁为柱纤结构, 鳞板下为微粒, 上为层纤结构。  
大34 B3补3 单偏光 显微放大75倍







## 2. 柱纤结构

纤体主要为文石，少数为方解石。

纤体沿基线向外向上生长并且与基线的交角逐渐增大，形成束状或喷泉状（少数呈斜交或垂直）。

柱纤结构之纵切面呈长条状，大致呈前进波状消失；横切面呈圆或多边形，十字消光。









### 3. 球纤结构

纤体向周围呈放射状生长并相互嵌结。

全球纤的任何断面均为圆形且为放射状十字消光；

锥球纤则只有横断面为圆、呈放射状十字消光，而纵断面呈扇形、显波状消光。






## 4. 柱层纤结构

纤体呈周期性向一个方向辐射生长，因而产生纤层，并叠积成柱状。

与柱纤不同的是有生长层纹，与层纤不同的是弯曲度很大，有辐射纹。

在正交偏光下，纵切面呈放射状波状消光，横切面呈十字消光。

柱层纤结构常见于头足类、瓣鳃类和腹足类的外层，也见于介形虫主壳层。





## 5. 玻纤结构

纤体垂直基面生长，宽 $<0.5\text{~}1\text{ }\mu\text{m}$ ，随壳面的平直或弯曲而作平行或放射状排列。

在单偏光镜下透明，有时因富含有机质而呈浅棕黄色；在正交镜下，呈均匀的波状消光。

玻纤结构是节肢动物三叶虫和大部分甲壳纲（包括介形虫亚纲）钙壳的主要特征。



长江大学地球科学学院  
School of Geoscience, Yangtze University



### (三) 片状结构 (Sheetlike texture)

指由两向延长、厚度 $<1\sim2\mu\text{m}$ 、近于平行的片状方解石或文石晶体堆叠而成的结构。

常见于苔藓、腕足、软体动物。

按叠加方  
式划分



平行片状结构

倾斜片状结构

交错片状结构


复杂交错片状结构

珍珠结构



# 1. 平行片状结构

由 $<1\text{ }\mu\text{m}$ 厚的片状方解石（或文石）晶体  
与壳面平行叠积而成。



常见于苔藓虫、腕足、龙介和锥壳纲中  
(竹节石)。




图 III-2-【7】-(1)

切面为腕足壳的切面（图中心）、横切面（右上方右下方），其它为斜切面。

塔西南 P1 单偏光 照片长边长 7.5 mm



图 III-2-【7】-(2)

具壳褶的腕足  
图中心为腕足壳的切面，具放射褶，钙壳为平行片状结构。

西北杨家坪 Q1-2 44-B6 单偏光 照片长边长 7.5 mm






## 2. 倾斜片状结构

由1~2  $\mu\text{m}$ 厚的方解石（或文石）小片同向倾斜叠积而成。

小片左右相连组成的片层与壳面或骨骼表面斜交，倾斜的方向与生长方向一致。

在单偏光镜下，  
层片色浅、稀疏、弯曲不规则，延伸较短。






### 3. 交错片状结构

层片呈板状或楔状，厚4~40  $\mu\text{m}$ ，由光轴一致的多个文石小片平行叠积而成，并构成独立的消光单位，而文石小片体又是由许多文石针或小片条平行排列叠积组成。

但在相邻的两个楔体或板状体中，层片的倾斜方向相反，彼此交错叠积。

仅见于现代的软体动物中，而在化石中多已转化成晶粒结构。





#### 4. 复杂交错片状结构

层片形状不规则，无一定规则界线。

组成层片的小片条光性方位不一致，同一楔体（或板状体）的层片也显示出交错性。

在正交偏光镜下，任一切面的任何部分均显示不规则消光。


在化石中易转化为晶粒结构。



## 5. 珍珠结构

珍珠片厚 $0.3\text{~}1\mu\text{m}$ ，宽 $5\text{~}10\mu\text{m}$ ，单片呈六边形、圆形或椭圆形，在生长过程中逐渐扩大，联成一片。

珍珠片由文石针垂直片面排列而成，其C轴与片垂直。






珍珠层在单偏光下透明均匀，在正交偏光下呈大面积的一致消光。

为现代高级软体动物的主要特征，常见于头足类的主壳层和某些现代瓣鳃类、腹足类的中层和内层。

牡蛎  
碎片





## （四）柱状结构 (Columnar texture)

多为方解石（有时为文石）所形成。


柱体较宽，短轴宽大于 $5\mu\text{m}$ ，延长度则远较纤状结构中的纤体为小。

柱体长轴垂直或倾斜于壳面，每个柱体是一个单独的消光单位。柱体间界线规则或不规则。柱体横断面为正方形或多边形。

一些软体类（腹足、瓣鳃）和一些腕足类的壳体外层可见柱状结构。



在纵切面上，可见到明显的互相平行的垂直壳面的柱体，在横切面上，则近似晶粒结构。





## 归纳分类：

原生结构

粒状结构（除晶粒结构外）

纤、柱、片状结构

次生结构

晶粒结构

各种钙质化石原生显微结构存在低级到高级的演化：粒状 纤（柱）状 片状 单晶结构





### 三、碳酸盐岩中常见生物门类骨骼鉴定特征

#### （一）钙质藻类





绿藻门    { 粗枝藻科  
                  松藻科



照片 III-2-【1】-(6) 松藻  
图中心三个长条状为松藻纵切面切片的碎片，具晶粒结构，丝体孔灰质  
充填。  
C-III-50 单偏光 照片长边长 7.5 mm

粗枝藻




红藻门

裸松藻科

珊瑚藻科


管孔藻科

翁格达藻科






## (二) 原生动物门




有孔虫的各种形态

有孔虫 蜓类




126. 有孔虫碎片

单列和双列有孔虫的切面。






### (三) 海绵动物门




C-III-52, 海绵, 单偏光。

海绵体壁晶粒结构，水管为泥晶或亮晶方解石充填



海绵骨针的各种形态




海绵骨针



## (四) 腔肠动物门

珊瑚纲

水螅纲





长江大学地球科学学院  
School of Geoscience, Yangtze University



# 水螅纲层孔虫目




照片 III-2-【5】-(1) 层孔虫

层孔虫个体粗大，群体宽2M，厚1M，骨骼由无数水平排列灰质层（具微粒结构和层纤结构）和垂直灰质柱（具柱纤结构）组成网格，柱廊亮晶方解石充填。

单偏光 照片长边长7.5 mm



## (五) 苔藓动物门




照片 III-2-【6】-(2) 苔藓虫  
图为照片1放大,虫室壁为平行片结构,虫室为亮晶方解石充填。  
塔西南P1 单偏光 照片长边长2 mm



## (六) 腕足动物门 {

无铰纲

有铰纲



照片 III-2-【7】-(1) 腕足类

图为具壳褶的腕足钙壳, 具平行片状结构, 左上方弯钩状为玻纤结构

纤虫

宜昌黄花场O1h 单偏光 照片长边长7.5 mm



照片 III-2-【7】-(2) 具壳褶的腕足

图中心为腕足壳的切面, 具放射褶, 钙壳为平行片状结构。

湘西北杨家坪O1-2 4 4-B6 单偏光 照片长边长7.5 mm



## (七) 软体动物门



软舌螺纲

竹节石纲

腹足纲


瓣鳃纲


头足纲



## 竹节石纲

照片 III-2-【8】-(1) 竹节石  
此为纵向、横向切面, 为玻纤结构。  
C-III-9 2 单偏光 照片长边长5 mm





照片 III-2-【8】-(4) 腹足类、苔藓虫

图左侧和右上方为晶粒结构腹足类横切面、斜切面，体腔内由灰泥和亮晶方解石充填显示底构造。右侧为苔藓虫纵切面的碎屑。

塔西南P1 单偏光 照片长边长 7.5 mm





## (八) 节肢动物门

{

三叶虫纲

甲壳纲






照片 Ⅲ-2-【9】-(5) 介形虫

图中三个椭圆形者为完整介形虫，壳薄具玻纤结构，体腔亮晶方解石填。

中59-B74 单偏光 照片长边长7.5 mm

## 甲壳纲介形虫亚纲









# (九) 棘皮动物门 {


## 海百合纲

## 海胆纲






照片 III-2-【10】-(1) 海百合  
图为两个海百合茎板, 具边连生单晶结构。  
塔西南P1 单偏光 照片长边长 7.5 mm



165. 蘆屑

棘皮动物壳壁的横切面具单晶结构和非常特征的花边状。





# 本节要点：

- 碳酸盐岩生物骨骼的主要矿物成分
- 钙质生物骨骼的结构分类
- 碳酸盐岩中常见的生物门类骨骼的鉴定特征  
(重点)